令和7年産水稲主要品種の栽培管理の目安

●仲多度地区:平坦地域の場合(中山間地域は除く)

JA香川県中讃営農センター(仲多度用) 香川県中讃農業改良普及センター 監修

									日/リホー 映	72 () () (日次とアグー曲形
品種	田植日	田干し期間 (開始〜終了)	必須防除 【本田1回目】 「粒剤」を選択した場合			必須防除【本田1回目】「フロアブル・顆粒水溶剤の混合」又は「粉剤」を選択した場合			必須防除 【本田2回目】 スタークル粒剤(粉剤DL)	落水期	収穫適期
		※1株の茎数が20~30 本程度になれば、田面の 亀裂が1㎝程度になるよう 田干しを行い、黒湿りを 保つ。過度な田干しは生 育を抑制するので注意。	ゴウケツモンスター 粒剤	穂肥Ⅰ		が ダブルカットバリダフロ い アブル、スタークル顆粒 ず 水溶剤の混合散布		いずれか	スターグル松削(初削DL) 	収穫7日前 から落水 開始	※肥培管理や出穂後の気温
			出穂20~15日前※			11 か ダブルカットバリダトレ ボン粉剤3DL			スタークル豆つぶ		等で収穫適期がほ場ごとに 異なるため、収穫は籾黄変 率85~90%及び籾水分26
			※収穫45日前まで	出穂16日前		出穂直前			出穂10~20日後		~27%を目安に開始し、刈り遅れに注意。
コシヒカリ	5月1日	6月5日~6月15日	6月28日~7月3日	7月2日		7月15日~7月17日	7月18日	7月28日~8月7日		8月12日~	8月19日~8月21日
	5月15日	6月18日~6月28日	7月6日~7月11日	7月10日		7月23日~7月25日	7月26日	8月5日~8月15日		8月20日~	8月27日~8月28日
	6月1日	6月30日~7月10日	7月15日~7月20日	7月19日		8月1日~8月3日	8月4日	8月14日~8月24日		8月29日~	9月5日~9月7日
	6月15日	7月10日~7月19日	7月24日~7月29日	7月28日		8月10日~8月12日	8月13日	8月23日~9月2日		9月8日~	9月15日~9月17日
	6月20日	7月15日~7月21日	7月26日~7月31日	7月30日		8月12日~8月14日	8月15日	8月25日~9月4日		9月10日~	9月17日~9月19日
品種		田干し期間 (開始〜終了)	必須防除 【本田1回目】 「粒剤」を選択した場合	穂肥I	穂肥Ⅱ	必須防除 【本田1回目】 「フロアブル・顆粒水溶剤の混合」 又は「粉剤」を選択した場合	出穂期		必須防除 【本田2回目】	落水期	収穫適期
		※1株の茎数が20~30 本程度になれば、田面の 亀裂が1㎝程度になるよう 田干しを行い、黒湿りを 保つ。過度な田干しは生 育を抑制するので注意。	ゴウケツモンスター 粒剤			が ダブルカットバリダフロ アブル、スタークル顆粒 水溶剤の混合散布		いずれ	スタークル粒剤(粉剤DL)		
									スタークル顆粒水溶剤	収穫7日前 から落水	※肥培管理や出穂後の気温 等で収穫適期がほ場ごとに
			出穂20~15日前※			か ダブルカットバリダトレ ボン粉剤3DL		か	スタークル豆つぶ		異なるため、収穫は籾黄変 率85~90%及び籾水分26
			※収穫45日前まで	出穂18日前	出穂10日前	出穗直前			出穂10~20日後		~27%を目安に開始し、刈り遅れに注意。
あきさかり	6月5日	6月30日~7月13日	7月18日~7月23日	7月20日		8月4日~8月6日	8月7日	8月17日~8月27日		9月4日~	9月11日~9月14日
	6月10日	7月5日~7月16日	7月21日~7月26日	7月23日		8月7日~8月9日	8月10日	8月20日~8月30日		9月8日~	9月15日~9月18日
	6月15日	7月10日~7月18日	7月24日~7月29日	7月26日		8月10日~8月12日	8月13日	8月23日~9月2日		9月12日~	9月19日~9月21日
ヒノヒカリ	6月15日	7月15日~7月30日	8月5日~8月10日	8月7日	8月15日	8月22日~8月24日	8月25日	9月4日~9月14日		9月22日~	9月29日~10月3日
	6月20日	7月20日~8月2日	8月7日~8月12日	8月9日	8月17日	8月24日~8月26日	8月27日	9月6日~9月16日		9月24日~	10月1日~10月5日
	6月25日	7月25日~8月8日	8月10日~8月15日	8月12日	8月20日	8月27日~8月29日	8月30日	9月9日~9月19日		9月28日~	10月5日~10月9日
おいでまい	6月20日	7月20日~7月29日	8月8日~8月13日	8月10日	8月18日	8月25日~8月27日	8月28日	9月7日~9月17日		9月27日~	10月4日~10月8日
	6月25日	7月23日~8月1日	8月10日~8月15日	8月12日	8月20日	8月27日~8月29日	8月30日	9月9日~9月19日		9月29日~	10月6日~10月11日
	6月30日	7月25日~8月3日	8月12日~8月17日	8月14日	8月22日	8月29日~8月31日	9月1日	9月11日~9月21日		10月2日~	10月9日~10月14日

※収穫適期は、過去5年間の多度津アメダスの平均気温データ(5中3)により、出穂期からの積算気温で算出して目安を設定した。 品種ごとの積算温度は、コシヒカリ:900~950℃、あきさかり:1,000~1,050℃、ヒノヒカリ:920~1,030℃、おいでまい:950~1,050℃とした。

各地区の水稲栽培のしおりがご覧になれます。→